



ที่ บก ๐๐๒๓.๖/ว ๔๕๔๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไอกรน เป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไอกรนได้ในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไอกรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.บึงกาฬ
เลขที่รับ 9426
วันที่ 02 ธ.ค. 2557
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่รับ 411
วันที่ 02 ธ.ค. 2557
เวลา 12.55

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๗๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไอกรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดโรคไอกรนได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไอกรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนาภรณ์ สองแก้ว
นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ



โรคไอกกรน

อันตรายถึงชีวิต



“โรคไอกกรน”

ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรงพบได้บ่อย
ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือการกตังแต่เดือนแรก

อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน
ต่อมาจะมีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง
ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบ
ตาแดง มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกกรนในเด็ก
อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน


ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน

ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน

ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน

ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้น
เมื่ออายุ 4 ปี

การรักษา

- ✚ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น 
- ✚ สวมหน้ากากอนามัย
- ✚ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- ✚ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอบ่อยขึ้น เช่นๆ การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ฯ
- ✚ หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไอติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์

